

郑州市金水区农业农村工作委员会文件

金农〔2016〕48号

金水区农业农村工作委员会 关于印发 2016-2018 年布鲁氏菌病 防控规划的通知

各相关街道办事处农办、动物疫控中心、动物卫生监督所：

为切实做好布鲁氏菌病的防控工作，确保畜牧业持续稳定健康发展和畜产品质量安全，根据《布鲁氏菌病防治技术规范》、《国家中长期动物疫病防治规划（2012—2020 年）》、《郑州市 2016-2018 年布鲁氏菌病防控规划（试行）》等要求，结合我区实际，制定《金水区 2016-2018 年布鲁氏菌病防控规划》，现印发给你们。请按照职责分工认真贯彻落实，切实做好布鲁氏菌病防控的具体实施工作。

附件：金水区 2016-2018 年布鲁氏菌病防控规划



附件:

金水区 2016-2018 年布鲁氏菌病防控规划

布鲁氏菌病(以下简称“布病”)是由布鲁氏杆菌引起的严重危害人民群众身体健康和畜牧业发展的人畜共患传染病,已成为重大的公共卫生问题。为有效控制布病在我区的发生和蔓延,加快布病净化工作进程,彻底消除传染源,保障人民群众身体健康,减少布病给畜牧业生产造成的经济损失,结合我区实际,现制定布鲁氏菌病防控规划,具体内容如下:

一、指导思想

深入贯彻落实《国家中长期动物疫病防治规划(2012—2020年)》,坚持人畜间同步、联防联控的原则,采取全面监测、检疫监管、强制扑杀等综合措施,逐步控制、净化和消灭布病。

二、工作目标

(一) 羊属动物实行全面监测、净化及免疫,确保布病疫情形势稳定,力争到 2018 年全区达到维持控制标准。

(二) 新进栏易感动物要达到 100% 监测。对于病畜及监测阳性畜要坚决扑杀,消灭传染源,切断传播途径,从而达到区域净化。

三、主要防控措施

(一) 监测

除 5 月龄以下羊及怀孕母羊外,其余均为监测对象。所有的

绵羊、山羊每年应进行两次血清学监测。

（二）流行病学调查

定期开展流行病学调查，重点加强对养殖数量大的养羊户流行病学调查。在调查过程中若发现有出现流产、空怀、死胎现象较为普遍时，应及时进行监测。对于有布病疫情发生时，应当采取紧急流行病学调查措施，扩大流调和监测范围，摸清传播途径，追溯传染源。有人间布病发生时，当地农办配合区畜牧部门做好畜间布病追踪溯源工作，无论发病病人是否有畜间接触史，均应进行流调，撰写调查报告。

（三）检疫监管

加强动物的检疫和调运监管工作。异地调入的动物，需具有调出地动物卫生监督机构出具的检疫证明。调入后应隔离饲养 30 天，经区动物卫生监督机构检验合格后，方可解除隔离，混群饲养。

（四）疫情处置

对于未免疫牲畜，监测出布病试管抗体阳性的要全部扑杀。对于免疫过的牲畜，畜主感染布病的，其所饲养的抗体阳性牲畜，要求全部扑杀。

已扑杀牲畜及其相关污染物，按照《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》 GB16548-1996 进行无害化处理。扑杀报告报郑州市动物疫病预防控制中心备案。

四、职责分工

各相关街道办事处农办：根据本规划负责制定辖区范围内羊布病监测净化方案并组织实施；确保三年内完成辖区所有养羊户布病监测净化。

区动物疫病预防控制中心：负责技术指导易感牲畜血清的采集、分离、送检工作。

区动物卫生监督所：负责阳性畜无害化处理的监督及违法案件的查处工作。同时协同工商、食品药品、质监、卫生等部门，做好动物检疫监督管理和动物流通监管工作，确保病畜及其产品不流通或流向市场。

村级防疫员：负责责任区域内的动物布病免疫、流行病学调查、采样、疫情普查等工作。要密切监督牲畜流动情况，一旦发现从外地输入牲畜情况，要及时向上级兽医部门报告。开展免疫工作过程当中，不得以任何理由将疫苗留给养殖户自行免疫，不得随意丢弃未使用完的疫苗，并做好相关器具的消毒工作。

养殖户：发现疑似疫情时，要及时向本村防疫员报告，并按相关规定积极配合技术人员采取防控措施，完成各项防控工作。养殖户从外地引进牲畜前，必须向乡镇畜牧兽医部门报告，经批准后方可引进，并要持有输出地动物卫生监督机构出具的产地检疫合格证等相关证明手续，引进后必须采取相应防控措施。

五、工作要求

(一) 注重宣传方法，提高群众意识

各级畜牧兽医主管部门要大力宣传布病防控政策和布病防控知识，凝聚各方面力量，营造全社会关心布病防治、支持布病防治的良好氛围，为推动布病防控提供良好的舆论导向。对兽医从业人员和饲养人员要定期举办培训班，增强培训工作的针对性，不断提升相关人员的布病防治技术水平和主动净化布病意识。

(二) 加强防护措施，确保人员安全

各级畜牧兽医主管部门对于易感人群应当制定相应的防护措施及物资保障措施，做好个人防护，定期健康检查，避免感染布病。对于患有布病的人员，在其治疗痊愈前禁止直接从事畜牧养殖等相关工作。

(三) 信息及时共享，实现联防联控

各级畜牧兽医主管部门要定期和卫生部门沟通，了解人间布病发生情况，及时开展相应流行病学调查和监测工作，查找传染源，采取相应的预防和控制措施，避免疫情蔓延。在畜间监测中发现布病阳性畜时，应当在出具正式监测报告后及时通报当地卫生部门，并建议其配合畜牧部门同时开展人畜间布病流行病学调查及排查，确保公共卫生安全。